

	OBLAST POUŽITÍ	INDIKACE	ZPŮSOB	DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK	KONCENTRACE	EXPOZICE	SPEKTRUM ÚČINNOSTI	ÚČINNÁ LÁTKA
RUCE	Mytí rukou	při znečištění rukou, po použití WC, před jídlem, při příchodu na pracoviště	rozetřít s malým množstvím vody, opláchnout, osušit ruce	<b>TEKUTÉ MÝDLO</b>	100%	-	-	-
	Hygienická dezinfekce rukou	před a po kontaktu s klientem před aseptickými výkony, po riziku kontaktu s tělními tekutinami, po kontaktu s okolím klienta	vtírat do suchých rukou, udržovat ruce vlhké po celou dobu expozice	<b>SEPTODERM</b>	neředěný 3ml	30 s	A(B+)TM(V)	etanol, isopropanol, KAS
				<b>SEPTODERM GEL</b>	neředěný 3ml	30 s	A(B+)TM(V)	etanol, isopropanol
	Regenerace pokožky	při pocitu suchých rukou, dle potřeby	vtírat do pokožky rukou	<b>OCHRANNÝ KRÉM</b>	100%	-	-	-
TĚLO A KÚŽE	Dezinfekce kůže	před injekcemi, odběry krve	nanést tampónem, řádně navlhčit, nechat zaschnout	<b>SEPTODERM SPRAY</b>	100%	15 s	A(V)	etanol, isopropanol, KAS
	Dezinfekce kůže, dezinfekce sliznic	při zavádění močových katétrů		<b>OCTENISEPT</b>	100%	30 s	A(B)	octenidin dihydrochlorid
	Dekolonizace těla pacienta, koupel	na dekolonizaci těla klienta od MRSA - 1x denně	na navlhčenou pokožku nanést dostatečné množství mýdla včetně vlasů, nechat působit, opláchnout	<b>PROSAVON SCRUB</b>	100%	1 min	A(B)(V)	chlorhexidin

## Dekontaminace nástrojů a pomůcek

NÁSTROJE A POMŮCKY	Předsterilizační příprava	čištění a dekontaminace pomůcek a předmětů z gumy, skla, kovu, porcelánu a plastů	vložit rozložené nebo rozmontované do pracovního roztoku; (případně otřít), dodržet exozoční čas, opláchnout pitnou vodou	<b>DISCLEEN EXTRA měsíc: 1,3,5,7,9,11</b>	1%	15 min	A(B)(V)	KAS, amin
				<b>CHIROSAN PLUS měsíc: 2,4,6,8,10,12</b>	1%	30 min	ABTM(V)	kys. peroct.
	Vyšší stupeň dezinfekce	zcela ponořit do pracovního roztoku	vložit rozložené nebo rozmontované do pracovního roztoku, proplachovat min. 5x všechny dutiny a kanály, dodržet exp. čas, opláchnout demineral. vodou	<b>CHIROSAN PLUS</b>	2%	10 min	ABCTMV	kys. peroct.

## Plošná dezinfekce povrchů

PLOCHY A POVRCHY	Čištění a dezinfekce povrchů	stoly, nábytek, postele, lůžka, lehátka, skříně, nádoby a jiné povrchy	umývání dezinfekčním roztokem dle harmonogramu; pracovním roztokem navlhčit plochy, pravidelně	DESAM EFEKT + měsíc: 1,3,5,7,9,11	0,25%	30 min	A(B)(V)	KAS, amin, fenoxetanol
				DESAM OX měsíc: 2,4,6,8,10,12	1%	15 min	A(B)TM(V)	peroxid vodíku, KAS
	ODMÝVÁNÍ DEZINFEKCE A ČIŠTĚNÍ - vždy při střídání aktivní látky				PROFLOOR UNI	0,5%	-	-

	Epidemiologicky závažné situace, cílené potlačení TBC, spór, vysoká organická zátěž; závěrečná (terminální) dezinfekce	plochy a povrchy navlhčit dezinfekčním roztokem	<b>DESAM PRIM</b>	3%	15 min	ABCV	chlór
--	--	---	-------------------	----	--------	------	-------

## Rychlá dezinfekce ploch a povrchů

RYCHLÁ DEZINFEKCE	Čištění a dezinfekce kontaktních míst v okolí klienta (materiály necitlivé na alkohol)	při kontaminaci povrchů a kontaminaci biologickým materiálem	nastříkat kontaminovaný povrch, nechat exponovat	<b>DESAM SPRAY</b>	100%	30 s	A(B+)TM(V)	alkohol, KAS
-------------------	--	--	--	--------------------	------	------	------------	--------------

OSTATNÍ	Výlevky, umyvadla, toalety, pisoáry, bidety	1x denně, dle potřeby	nalít do misky, nechat působit, opláchnout	<b>WC ČISTIČ</b>	100%	5 min	-	kyselina fosforečná
		1x denně, dle potřeby, podložní misky ihned po použití	umýt připraveným roztokem, nalít i do sifónu, nechat působit, opláchnout	<b>DESAM PRIM</b>	3%	15 min	ABV	chlór

**A** baktericidní (včetně MRSA) podle EN 13727, EN13607, EN16615, EN 14561, EN 1499, EN 1500 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, ev. E. coli)  
**(V)** fungicidní na kvasinky podle EN 13624, EN13697, EN16615, EN 14562 (Candida albicans)  
**(B)** virucidní na obalené viry podle DVV/RKI (BVDV, Vaccinia virus včetně HBV, HIV, HCV) podle EN 14476 (Adeno virus, MNV - ruce)  
**B** virucidní podle DVV/RKI, EN 14476 (adenovirus, poliovirus, MNV)  
**C** sporicidní EN 14347, EN 13704  
**T** tuberkulocidní podle EN 14348, EN 14563  
**M** mykobaktericidní podle EN 14348, EN 14563  
**V** fungicidní podle EN 13624, EN13697, EN14562  
**MNV** zástupný virus pro lidský norovirus

Dávkovací tabulka: 1x stisk pumpičky= 20ml

	0,25%	0,5%	0,75%	1%	1,5%	2%	3%	5%
<b>1</b>	2,5 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	50 ml
<b>2</b>	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	100 ml
<b>3</b>	7,5 ml	15 ml	22,5 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	150 ml
<b>4</b>	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	200 ml
<b>5</b>	12,5 ml	25 ml	37,5 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	250 ml
<b>8</b>	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml	400 ml
<b>10</b>	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	500 ml

Legenda:

	množství vody v litrech, které se spotřebuje na dezinfikovanou plochu
	množství koncentráту v ml, které se použije na přípravu pracovního roztoku s požadovanou koncentrací
	koncentrace pracovního roztoku