

	OBLAST POUŽITÍ	INDIKACE	ZPŮSOB	DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK	KONCENTRACE	EXPOZICE	SPEKTRUM ÚČINNOSTI	ÚČINNÁ LÁTKA
RUCE	Mytí rukou	při znečištění rukou, po použití WC, před jídlem, při příchodu na pracoviště	rozetřít s malým množstvím vody, opláchnout, osušit ruce	TEKUTÉ MÝDLLO	100%	-	-	-
	Hygienická dezinfekce rukou	před a po kontaktu s klientem před aseptickými výkony, po riziku kontaktu s tělními tekutinami, po kontaktu s okolím klienta	vtírat do suchých rukou, udržovat ruce vlhké po celou dobu expozice	SEPTODERM	neředěný 3ml	30 s	A(B+)TM(V)	etanol, isopropanol, KAS
				SEPTODERM GEL	neředěný 3ml	30 s	A(B+)TM(V)	etanol, isopropanol
	Regenerace pokožky	při pocitu suchých rukou, dle potřeby	vtírat do pokožky rukou	OCHRANNÝ KRÉM	100%	-	-	-
TĚLO A KÚŽE	Dezinfekce kůže	před injekcemi, odběry krve	nanést tampónem, řádně navlhčit, nechat zaschnout	SEPTODERM SPRAY	100%	15 s	A(V)	etanol, isopropanol, KAS
	Dezinfekce kůže, dezinfekce sliznic	při zavádění močových katétrů		OCTENISEPT	100%	30 s	A(B)	octenidin dihydrochlorid
	Dekolonizace těla pacienta, koupel	na dekolonizaci těla klienta od MRSA - 1x denně	na navlhčenou pokožku nanést dostatečné množství mýdla včetně vlasů, nechat působit, opláchnout	PROSAVON SCRUB	100%	1 min	A(B)(V)	chlorhexidin

Dekontaminace nástrojů a pomůcek

NÁSTROJE A POMŮCKY	Předsterilizační příprava	čištění a dekontaminace pomůcek a předmětů z gumy, skla, kovu, porcelánu a plastů	vložit rozložené nebo rozmontované do pracovního roztoku; (případně otřít), dodržet exozoční čas, opláchnout pitnou vodou	DISCLEEN EXTRA měsíc: 1,3,5,7,9,11	1%	15 min	A(B)(V)	KAS, amin
				CHIROSAN PLUS měsíc: 2,4,6,8,10,12	1%	30 min	ABTM(V)	kys. peroct.
	Vyšší stupeň dezinfekce	zcela ponořit do pracovního roztoku	vložit rozložené nebo rozmontované do pracovního roztoku, proplachovat min. 5x všechny dutiny a kanály, dodržet exp. čas, opláchnout demineral. vodou	CHIROSAN PLUS	2%	10 min	ABCTMV	kys. peroct.

Plošná dezinfekce povrchů

PLOCHY A POVRCHY	Čištění a dezinfekce povrchů	stoly, nábytek, postele, lůžka, lehátka, skříně, nádoby a jiné povrchy	umývání dezinfekčním roztokem dle harmonogramu; pracovním roztokem navlhčit plochy, pravidelně	DESAM EFEKT + měsíc: 1,3,5,7,9,11	0,25%	30 min	A(B)(V)	KAS, amin, fenoxetanol
				DESAM OX měsíc: 2,4,6,8,10,12	1%	15 min	A(B)TM(V)	peroxid vodíku, KAS
	ODMÝVÁNÍ DEZINFEKCE A ČIŠTĚNÍ - vždy při střídání aktivní látky				PROFLOOR UNI	0,5%	-	-

	Epidemiologicky závažné situace, cílené potlačení TBC, spór, vysoká organická zátěž; závěrečná (terminální) dezinfekce	plochy a povrchy navlhčit dezinfekčním roztokem	DESAM PRIM	3%	15 min	ABCV	chlór
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------	----	--------	------	-------

Rychlá dezinfekce ploch a povrchů

RYCHLÁ DEZINFEKCE	Čištění a dezinfekce kontaktních míst v okolí klienta (materiály necitlivé na alkohol)	při kontaminaci povrchů a kontaminaci biologickým materiálem	nastříkat kontaminovaný povrch, nechat exponovat	DESAM SPRAY	100%	30 s	A(B+)TM(V)	alkohol, KAS
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------	------	------	------------	--------------

OSTATNÍ	Výlevky, umyvadla, toalety, pisoáry, bidely	1x denně, dle potřeby	nalít do mísy, nechat působit, opláchnout	WC ČISTIČ	100%	5 min	-	kyselina fosforečná
		1x denně, dle potřeby, podložní mísy ihned po použití	umýt připraveným roztokem, nalít i do sifónu, nechat působit, opláchnout	DESAM PRIM	3%	15 min	ABV	chlór

A baktericidní (včetně MRSA) podle EN 13727, EN13607, EN16615, EN 14561, EN 1499, EN 1500 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, ev. E. coli)
(V) fungicidní na kvasinky podle EN 13624, EN13697, EN16615, EN 14562 (Candida albicans)
(B) virucidní na obalené viry podle DVV/RKI (BVDV, Vaccinia virus včetně HBV, HIV, HCV) podle EN 14476 (Adeno virus, MNV - ruce)
B virucidní podle DVV/RKI, EN 14476 (adenovirus, poliovirus, MNV)
C sporicidní EN 14347, EN 13704
T tuberkulocidní podle EN 14348, EN 14563
M mykobaktericidní podle EN 14348, EN 14563
V fungicidní podle EN 13624, EN13697, EN14562
MNV zástupný virus pro lidský norovirus

Dávkovací tabulka: 1x stisk pumpičky= 20ml

	0,25%	0,5%	0,75%	1%	1,5%	2%	3%	5%
1	2,5 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	50 ml
2	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	100 ml
3	7,5 ml	15 ml	22,5 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	150 ml
4	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	200 ml
5	12,5 ml	25 ml	37,5 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	250 ml
8	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml	400 ml
10	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	500 ml

Legenda:

	množství vody v litrech, které se spotřebuje na dezinfikovanou plochu
	množství koncentráту v ml, které se použije na přípravu pracovního roztoku s požadovanou koncentrací
	koncentrace pracovního roztoku